

Przygotowanie do biopsji gruczołu krokowego

dla pacjentów Poradni Urologicznej przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie

Ustalenie terminu biopsji:

osobiście w poradni w pokoju 37 lub telefonicznie 14-63-15-226, w godzinach 7:30 – 14:30.

Antybiotyki - należy stosować zgodnie z otrzymaną receptą, np.:

Levoxa, Xyvelam, Levofloxacin	500mg 1xdz	Zacząć 3 dni przed biopsją, kontynuować łącznie 7 dni
Cetix	400mg 1xdz	Przyjmować: dzień przed biopsją rano, w dniu biopsji rano, dzień po biopsji rano
Monural	3g 1op.	1op. rano w dniu biopsji, kolejne 2 dni po biopsji

Wlewka doodbytnicza (lewatywa)

- w przeddzień biopsji wieczorem zrobić 1 wlewkę, powtórzyć rano
- wykonywać, tylko jeśli zalecił to lekarz
- można kupić w aptece bez recepty (np. Enema, Proctanal, Rectanal)

Należy odstawić leki wpływające na krzepnięcie krwi!

Proponowany czas odstawienia leków, np:

Lek	Kiedy odstawić?	Uwagi
Warfaryna (Warfin), acenokumarol	3-5 dni	Konieczne badanie krwi (INR) rano w dniu biopsji
dabigatran (Pradaxa)	2-4 dni	nie ma potrzeby wykonania badań
rywaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis)	2 dni	
klopidogrel (Agregex, Areplex, Carder, Clopidix, Clopidogrel, Grepid, Pegorel, Plavix, Plavocorin, Trombex, Vixam, Zyllt) prasugrel (Efient, Bewim) tikagrelor (Brilique)	7 dni	wskazana konsultacja kardiologiczna!
Polocard, Acard	7 dni	odstawienie nie jest bezwzględnie konieczne

Wyłącznie zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub kardiologiem.

Może być konieczne przejściowe stosowanie zastrzyków przeciwzakrzepowych.

W przypadku przyjmowania zastrzyków przeciwzakrzepowych

Ostatni zastrzyk należy przyjąć rano w dniu poprzedzającym biopsję.

W dniu biopsji kategoriycznie nie wolno przyjmować zastrzyku, konieczne jest zachowanie 24h przerwy.

Wybrany chorym z poważnymi chorobami układu krążenia nie wolno odstawić w/w leków. Nie można wtedy wykonać biopsji!

W DNIU BIOPSJI NALEŻY:

- Spożyć lekkie śniadanie
 - Zabrać ze sobą jedzenie i picie - do spożycia po biopsji
 - Zabrać ze sobą listę przyjmowanych leków oraz dokumentację medyczną (w tym skierowanie, jeśli to będzie pierwsza wizyta) ,
 - Zabrać ze sobą **opis i płytę z badania rezonansu magnetycznego prostaty**, jeżeli wykonano rezonans poza tutejszym szpitalem
 - **Zgłosić się rano (godz. 8-9) do Poradni, bezpośrednio do pokoju 37**
- Pielęgniarka zweryfikuje przygotowanie pacjenta, następnie przekieruje na oddział (6. piętro). Pacjent rano otrzyma dokładny termin wizyty kontrolnej (za ok. 4 tygodnie) celem odbioru i omówienia wyników biopsji
- Zazwyczaj biopsja wykonywana jest rano, ale wyjątkowo, z powodu pilnych zabiegów, możliwe jest nawet kilkugodzinne oczekiwanie na lekarza
 - **Lek przeciwbólowy** (np. Tramal): można zażyć dopiero na oddziale na ok. 30 min. przed biopsją, po konsultacji z pielęgniarką.

Informacja dodatkowa nt. biopsji gruczołu krokowego.

Biopsja prostaty trwa około 20 minut.

Po badaniu należy pozostać na obserwacji przez minimum 1 godzinę.

Po biopsji często obserwuje się krew w moczu, stolcu lub nasieniu, niekiedy pogorszenie sprawności oddawania moczu. Najczęściej są to dolegliwości przejściowe, ulegające samoograniczeniu. W przypadku zatrzymania moczu należy zgłosić się do dowolnej placówki ochrony zdrowia.

W przypadku gorączki (temp.min 38 st.C) należy niezwłocznie zgłosić się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)! W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do rozwoju sepsy, dlatego niezbędna jest pilna ocena lekarska!